

Es liegen 3 Nachweise vor. Der Weltbestand dieser Art nimmt seit Jahren ständig ab. Es ist deswegen erfreulich, dass sie immer noch hin und wieder in unserem Raum festzustellen ist.

In 2013 stellten Sührig und E. Göttgens zwischen dem 13. und dem 20. Jan. auf den Gronauer Kiesteichen 1 Männchen im 2. Kalender Jahr fest. Rotzoll, Sührig und Bexter haben 1 Weibchen auf dem Westteich in Nordstemmen Kiesteiche Nord zwischen dem 13. und 21. April 2014 gesehen.

Besonders interessant war der von Sührig auf den Kiesteichen in Brüggen festgestellte „Long Stayer“. Das vorjährige Weibchen verweilte etwa 7 Wochen lang vom 24. Januar bis zum 13. März 2016.

Weitere Meldungen waren:

Gronauer Masch Kiesteiche (Gesamt)

13.01.2013 1 Ex. Ad. M. und 1Ex. 2 Kj/vj. Sührig

19.01.2013 1 Ex. Ad. M. und 1Ex. 2 Kj/vj. E. Göttgens, Sührig

20.01.2013 1 Ex. Ad. M. und 1Ex. 2 Kj/vj. Sührig

13. - 16.04.2014 1 Ex. Ad. W. Nordstemmen Kiesteiche Nord: West Teich. Sührig, Bexter, Rotzoll